

RİSKLİ ALKOL KULLANIMI VE ALKOL KULLANIM BOZUKLUĐU



ALKOL KULLANIM BOZUKLUĐU NEDİR?

Kiřide "alkol kullanım bozukluđu" olması için 1 yıl içinde ařađıdakilerden en az ikisi bulunmalı:

- İstendiđinden daha fazla veya uzun süreli kullanım.
- Alkolü bırakmak için istek veya sonuç vermeyen çabalar.
- Alkolü elde etmek için gerekli etkinliklere çok zaman ayırmak.
- Alkol kullanımını için çok büyük bir istek duyma veya kendini zorlanmış hissetme.
- Tekrar eden kullanım sonucu işte, okulda, evde sorumlulukları yerine getirememe
- Toplumsal ve kişiler arası sorunlara rağmen kullanıma devam etme.

ALKOL KULLANIM BOZUKLUĐU NEDİR?

- Kullanımdan dolayı gnlk etkinliklerin aksaması.
- Tehlikeli olabilecek durumlarda kullanmaya devam etme.
 - Olumsuz etkilerinin bilinmesine raėmen kullanmayı srdrmek.
 - Tolerans gelişim belirtileri olması
 - İstenen etkinin ortaya çıkması için artan madde gereksinimi.
 - Aynı miktarda maddenin srekli kullanım sonucu etkisinin azalması durumu
 - Yoksunluk belirtilerinin gelişmiş olması (bulantı, uykusuzluk, kusma, sinirlilik, bunaltı, huzursuzluk, saldırganlık, ishal, terleme, titreme, kas sızıları, ateş vb.)

3.5

Her yıl 3.5 milyon insan alkole bađlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetmektedir.

3.

Alkol tüm dünyada önlenebilir ölüm ve yaralanmaların üçüncü temel nedenidir.



Alkolden doğan maddi zarar alkolden elde edilen gelirden çok daha fazladır.

200

Riskli alkol kullanımını 200'den fazla hastalık ve yaralanma durumuna neden olur.



Eđitimde başarısızlık, suça eğilim, alkole bađlı sađlık problemleri alkol kullanımıyla doğru orantılı olarak artar.

RİSKLİ ALKOL KULLANIMI NEDİR?

Erkekler için bir seferde 4 ya da daha fazla birim alkol ya da haftalık 14'ten fazla birim alkol kullanılması riskli alkol kullanımudur.


Kadınlar için bir seferde 3 ya da daha fazla birim alkol ya da haftalık 7'den fazla birim alkol kullanılması riskli alkol kullanımudur.



BİR BİRİM ALKOL NE KADAR BİLİYOR MUSUN?

1 tek votka, cin, viski
1 tek rakı

1 kadeh şarap
330 ml bira



ALKOLÜN YOL AÇTIĞI SAĞLIK SORUNLARININ FARKINDA MISIN?

Kısa dönemde ortaya çıkan sağlık sorunları:



Motorlu taşıt kazaları, düşmeler boğulmalar ve yanıklar gibi yaralanmalar.

Cinayet, intihar, cinsel saldırı ve yakın partner şiddeti dahil şiddet.



Alkol zehirlenmesi gibi kandaki yüksek alkol seviyelerinden kaynaklanan acil durumlar.

Korunmasız seks veya birden fazla partnerle seks dahil riskli cinsel davranışlar. Bu davranışlar istenmeyen gebelik veya HIV dahil cinsel yolla bulaşan hastalıklara



Hamile kadınlar arasında düşük ve ölü doğum veya Fetal Alkol Sendrom bozuklukları.

ALKOLÜN YOL AÇTIĐI SAĐLIK SORUNLARININ FARKINDA MISIN?

Uzun dönemde ortaya çıkan sađlık sorunları:
Yüksek tansiyon, kalp hastalığı, felç, karaciđer hastalığı
ve sindirim sorunları.



Bađışıklık sisteminin zayıflaması,
ve artan hastalanma riski.

Meme, ađız, bođaz, yemek borusu, karaciđer ve
kolon kanseri.



Demans ve kötü okul performansı
dahil öğrenme ve hafıza sorunları.

ALKOLÜN YOL AÇTIĐI SAĐLIK SORUNLARININ FARKINDA MISIN?

Uzun dönemde ortaya çıkan sađlık sorunları:



Üretkenlik kaybı, aile sorunları ve işsizlik gibi sosyal sorunlar.

Depresyon ve anksiyete dahil ruh sađlığı sorunları.



Alkol kullanım bozuklukları veya alkol bađımlılıđı.

YARDIM ALABİLİRSİN!



YESİLAY



Bu kuruluşlar gizlilik esasında ücretsiz hizmet vermektedir.